


Аллергические заболевания



Атопический дерматит


В лечении атопического дерматита (АД), в соответствии со стандартами, используются антигистаминные, седативные, кортикостероиды, иммуномодулирующие и др. лекарственные средства. Действие этих препаратов направлено преимущественно на подавление симптомов хронического воспаления, что приводит к прогрессированию заболевания, рецидивирующему течению, снижению эффективности применяемых схем лечения.

Препараты Heel позволяют реализовывать принципы патогенетического лечения АД, оптимизировать течение заболевания, а в начальной стадии способствуют его полному завершению и достижению излечения.

Препараты для ответственного самолечения пациента



Дополнительно рекомендуются провизором*



Назначаются врачом, при необходимости

| | | |
|--|--|---|
| Прогрессирование заболевания, ухудшение состояния | Траумель С (таблетки, ампулы) | <ul style="list-style-type: none">• способствует полному завершению воспалительного процесса• восстанавливает поврежденные ткани |
| Обширное и глубокое распространение отека | Лимфомиозот Н (ампулы) | <ul style="list-style-type: none">• активизирует процессы лимфодренажа и детоксикации• устраняет отек слизистой |
| При сопутствующих функциональных расстройствах ЖКТ | Нукс вомика-Гомаккорд (капли) | <ul style="list-style-type: none">• восстанавливает баланс вагусной регуляции ЖКТ• устраняет воспаление в слизистой органов ЖКТ |
| Затяжное течение заболевания (с момента стихания обострения) | Эхинацея композитум С (ампулы) | <ul style="list-style-type: none">• формирует адекватный иммунный ответ• уменьшает эндогенную интоксикацию |
| Нарушение функции печени | Гепар комп. Хеель (ампулы) | <ul style="list-style-type: none">• активизирует дезинтоксикационную функцию печени• регулирует обменные процессы |

*С целью усиления эффекта терапии, врач может дополнительно включать в схемы препараты, которые рекомендовал провизор, но в инъекционной форме.

Особенности применения:

- Лечение необходимо начинать с иницирующего приема препаратов. При улучшении состояния – перейти на обычный режим приема.
- Курс лечения пероральными формами – 4-6 недель, инъекционными – № 10-15. Возможен прием всех ампулированных форм в виде «питьевых ампул».
- Эффект терапии можно усилить введением препаратов методом ступенчатой аутогемотерапии, гомеосиниатрии (в акупунктурные точки), биопунктуры.
- Для предупреждения сезонного обострения рекомендуется проводить профилактический курс терапии (препараты Траумель С, Лимфомиозот, Графитес Коспоплекс С в обычной дозировке). Начинать профилактику целесообразно за 1 -1,5 месяца до предполагаемого обострения.



Применение препаратов Heel позволяет:

- быстро устранить симптомы заболевания без их подавления
- на начальных стадиях заболевания – достичь полного выздоровления
- снизить риск развития тяжелых аллергических заболеваний
- сократить длительность приема и снизить побочные эффекты препаратов