



Деформирующий остеоартроз


Лечение деформирующего остеоартроза представляет трудную задачу, что связано с необратимостью дегенеративных изменений суставного хряща. Использование традиционных препаратов не всегда дает желаемый результат, кроме того они могут быть противопоказаны некоторым категориям пациентов.

Препараты Neel по эффективности сопоставимы с традиционными фармпрепаратами, однако не имеют присущих им побочных эффектов и противопоказаний. Применение препаратов Neel позволяет снизить дозировку обезболивающих и противовоспалительных средств или совсем обходиться без них, способствуют лучшему усвоению традиционных хондропротекторов.

Препараты для ответственного самолечения пациента



Дополнительно рекомендуются провизором*



Назначаются врачом, при необходимости



*С целью усиления эффекта терапии, врач может дополнительно включать в схемы препараты, которые рекомендовал провизор, но в инъекционной форме.

Особенности применения:

- Лечение необходимо начинать с иницилирующего приема препаратов. При улучшении состояния – перейти на обычный режим приема.
- Курс лечения пероральными формами – 2-3 месяца, инъекционными – №10-15
- Эффект терапии можно усилить введением препаратов методом ступенчатой аутогемотерапии, гомеосиниатрии (в акупунктурные точки), биопунктуры (введение препарата п/к и в/к в болевые зоны). Рекомендуется периартикулярное или внутрисуставное введение препаратов.
- Эффективно проведение фонофореза с мазью Цель Т №8-12. Мазевые формы препаратов можно использовать в виде повязок или компрессов.



Применение препаратов Heel позволяет:

- обеспечить патогенетическое лечение деформирующего остеоартроза без дополнительной фармакологической нагрузки и побочных эффектов
- увеличить подвижность в суставах и повысить качество жизни пациента
- улучшить усвоение тканями традиционных хондропротекторов
- замедлить прогрессирование дегенеративно-дистрофических процессов
- уменьшить дозировки и длительность приема препаратов с нежелательными побочными эффектами