


# Дискинезии желчевыводящих путей

Дисфункция работы желчного пузыря и протоков приводит к расстройствам циркуляции и застою желчи, что увеличивает риск развития осложнения в виде холецистита или желчнокаменной болезни.

Препараты Neel являются эффективным средством патогенетической профилактики и терапии различных нарушений в работе печени и ЖВП, способствуют нормализации реологических свойств желчи, регулируя состояние сфинктера Одди и желчевыводящих путей, предотвращая развитие осложнений.

## Препараты для ответственного самолечения пациента



## Дополнительно рекомендуются провизором



## Назначаются врачом, при необходимости



### Особенности применения:

- Лечение необходимо начинать с иницилирующего приема препаратов. При улучшении состояния – перейти на обычный режим приема.
- Курс лечения пероральными формами – 1-2 месяца, инъекционными – №10-15
- Эффект терапии можно усилить введением препаратов методом ступенчатой аутогемотерапии, гомеосиниатрии (в акупунктурные точки), биопунктуры (введение препарата п/к и в/к в болевые зоны и проекции органов).

Сегментарная терапия проводится по методу «папулы» или подкожных инъекций паравerteбрально на уровне Th7-Th11, вентрально над правой реберной дугой и в сегменте С3-С4 в области переднего края трапециевидной мышцы справа.



### Применение препаратов Heel позволяет:

- оказать выраженный и быстрый клинический эффект при холестазах
- снизить риск развития хронических заболеваний органов гастродуоденальной зоны
- повысить эффективность терапии в целом, улучшить общее состояние и самочувствие пациента
- ограничить неблагоприятное воздействие препаратов на организм