

Климактерический синдром


В соответствии со стандартами, терапия климактерического синдрома (КС) включает заместительную гормональную и симптоматическую терапию, которые имеют спектр противопоказаний и ограничений. Кроме того, лечение не всегда позволяет достичь желаемого эффекта и сопровождается различными побочными эффектами.

Препараты Heel оказывают регулирующее действие на нейрогормональную систему женского организма. При легком и, в ряде случаев, среднетяжелом течении КС возможна монотерапия препаратами Heel, при тяжелом и среднетяжелом течении – эффективно дополняют гормонотерапию, минимизируя дозы, сроки лечения и побочные эффекты.

Препараты для ответственного самолечения пациента



Дополнительно рекомендуются провизором



Назначаются врачом, при необходимости



Особенности применения:

- Лечение необходимо начинать с иницилирующего приема препаратов. При улучшении состояния – перейти на обычный режим приема.
- Курс лечения пероральными формами – 1-2 месяца, инъекционными – №10-15
- Эффект терапии можно усилить введением препаратов методом ступенчатой аутогемотерапии, гомеосиниатрии, биопунктуры: инъекции в рефлексогенные зоны, инъекции в триггерные точки, инъекции в точки акупунктуры.

Сегментарная терапия проводится по методу «папулы» или подкожных инъекций в нижней части живота.



Применение препаратов Neel позволяет:

- одновременно воздействовать на все основные патогенетические звенья развития КС
- эффективно и безопасно провести коррекцию гормонального гомеостаза
- уменьшить дозу, длительность приема и побочные эффекты заместительной гормонотерапии
- снизить риск развития дегенеративных процессов в матке, маточных трубах и яичниках в климактерический период
- улучшить качество жизни и психо-эмоциональное состояние женщины