


# Заболевания опорно-двигательного аппарата




## Острый артрит (полиартрит)


Этиология и механизмы развития острого артрита сложны и многообразны. Медикаментозное лечение артрита включает в себя использование противовоспалительных и обезболивающих средств, которые оказывают негативное влияние на органы желудочно-кишечного тракта и организм в целом, однако не всегда позволяют получить удовлетворительный результат.

Препараты Heel комплексно воздействуют на все этиологические факторы острого артрита, предупреждают хронизацию острого процесса, тормозят развитие дегенеративно-дистрофических процессов и улучшают качество жизни пациентов.

### Препараты для ответственного самолечения пациента



### Дополнительно рекомендуются провизором



## Назначаются врачом, при необходимости



### Особенности применения:

- Лечение необходимо начинать с иницилирующего приема препаратов. При улучшении состояния – перейти на обычный режим приема.
- Курс лечения пероральными формами – 2-3 недели, инъекционными – №5-10
- Эффект терапии можно усилить введением препаратов методом ступенчатой аутогемотерапии, гомеосиниатрии (в акупунктурные точки), биопунктуры (введение препарата п/к и в/к в болевые зоны). Рекомендовано проведение околосуставных инъекций по методу «волдыря», внутрисуставных инъекций и инфильтраций суставной капсулы.
- Мазевую форму препарата Траумель С можно использовать в виде повязок или компрессов. Эффективно введение мази в виде фонофореза №8-10.



### Применение препаратов Heel позволяет:

- эффективно устранить болевой синдром, отек, утреннюю скованность
- оптимизировать течение и содействовать полному завершению воспаления
- предупредить развитие дегенеративно-дистрофических осложнений
- добиться полного восстановления функции суставов на этапе реабилитации
- снизить потребность в традиционных обезболивающих и противовоспалительных фармпрепаратах
- сократить сроки потери трудоспособности и улучшить качество жизни пациента