

Острый бронхит


Несмотря на применение широкого спектра фармпрепаратов при лечении острого бронхита, воспалительный процесс часто прогрессирует, принимает затяжное течение, переходит в хроническую форму. Это связано с тем, что действие фармпрепаратов направлено на подавление острого воспаления, нарушая естественный ход его разрешения.

Препараты Neel оптимизируют протекание воспалительного процесса и позволяют свести к минимуму частоту перехода острого воспаления в хроническое.

Препараты для ответственного самолечения пациента*



Дополнительно рекомендуются провизором



Назначаются врачом, при необходимости

Ухудшение состояния при заболевании вирусной этиологии	Энгистол (ампулы)	<ul style="list-style-type: none">• повышает противовирусную защиту организма• нормализует физиологические механизмы выведения токсинов
Прогрессирование заболевания, ухудшение состояния	Траумель С (ампулы)	<ul style="list-style-type: none">• сдерживает активность воспаления• предотвращает развитие осложнений
Выраженные симптомы интоксикации, гипертермия	Грипп-Хеель (ампулы)	<ul style="list-style-type: none">• быстро устраняет симптомы интоксикации• снижает риск развития осложнений
Кашель с гнойной мокротой, интоксикация, затяжное течение	Эхинацея композитум С (ампулы)	<ul style="list-style-type: none">• формирует адекватный иммунный ответ• уменьшает эндогенную интоксикацию
Затрудненное отхождение мокроты, длительный кашель	Мукоза композитум (ампулы)	<ul style="list-style-type: none">• нормализует секрецию и выведение слизи• восстанавливает структуру и функции слизистых дыхательного тракта

*С целью усиления эффекта терапии, врач может дополнительно включать в схемы препараты, которые выбрал пациент, но в инъекционной форме.

Особенности применения:

- Лечение необходимо начинать с иницилирующего приема препаратов. При улучшении состояния – перейти на обычный режим приема.
- Курс лечения пероральными формами – 2-3 недели, инъекционными – №5-10.
- Эффект терапии можно усилить введением препаратов методом ступенчатой аутогемотерапии, гомеосиниатрии (в акупунктурные точки), биопунктуры (введение препарата п/к и в/к в болевые зоны и проекции органов).

Сегментарная терапия проводится по методу «папулы» или подкожных инъекций паравerteбрально, парастернально над обоими легкими, в области С3/С4 (передний край трапецевидной мышцы).

- Возможно применение инъекционных форм препаратов в виде ингаляций.
- Эффективен электрофорез и массаж грудной клетки с мазью Траумель С.



Применение препаратов Heel позволяет:

- оптимизировать течение и полноценно завершить воспаление
- восстановить структуру и функции слизистой бронхов
- предупредить развитие тяжелых осложнений и хронизацию процесса
- эффективно дополнить стандартную терапию и сократить сроки лечения