


Острый тонзиллит

Терапия острого тонзиллита по протоколу не всегда обеспечивает полное завершение острого воспаления, предотвращение его перехода в хроническое и развитие осложнений со стороны сердца, суставов, почек и др. органов. Кроме того, для такой терапии характерны побочные эффекты и различные ограничения в применении.

Препараты Heel снижают риск развития тонзиллогенных осложнений и возможных побочных эффектов аллопатических препаратов. Они эффективно дополняют стандартную терапию, а при катаральной ангине являются безопасной альтернативой их применения.

Препараты для ответственного самолечения пациента



Дополнительно рекомендуются провизором



Назначаются врачом, при необходимости



Особенности применения:

- Лечение необходимо начинать с иницирующего приема препаратов. При улучшении состояния – перейти на обычный режим приема.
- Курс лечения пероральными формами – 2-3 недели, инъекционными – №5-10.
- Эффект терапии можно усилить введением препаратов методом ступенчатой аутогемотерапии, гомеосиниатрии, биопунктуры: инъекции в рефлексогенные зоны, инъекции в триггерные точки, инъекции в точки акупунктуры.
- Возможно применение инъекционных форм препаратов в виде ингаляций через ультразвуковой ингалятор.



Применение препаратов Neel позволяет:

- предотвратить необоснованное применение антибактериальных препаратов при катаральной ангине
- предупредить развитие тяжелых тонзиллогенных осложнений (на сердце, суставы, почки и др. органы)
- значительно снизить риск хронизации острого процесса
- эффективно дополнить стандартную терапию и сократить сроки лечения