



# Пневмония\*

Лечение пневмонии по стандарту носит преимущественно этиологический и симптоматический характер и только частично патогенетический. Применяют антибактериальные средства, отхаркивающие и муколитические препараты. Несмотря на проводимое лечение, пневмонии имеют тенденции к затяжному течению, переходят в хронические формы, при этом долго сохраняются астенические проявления, снижающие работоспособность и качество жизни людей.

Препараты Heel помогают устранить воспаление и отек, значительно снизить дозировку и побочные действия антибактериальных препаратов, восстановить функциональную активность дыхательных путей, предотвратить возникновение тяжелых осложнений.

## Препараты для ответственного самолечения пациента\*\*



## Дополнительно рекомендуются провизором



\* негоспитальная, госпитальная

## Назначаются врачом, при необходимости



\*\*С целью усиления эффекта терапии, врач может дополнительно включать в схемы препараты, которые выбрал пациент, но в инъекционной форме.

### Особенности применения:

- Лечение необходимо начинать с иницилирующего приема препаратов. При улучшении состояния – перейти на обычный режим приема.
- Курс лечения пероральными формами – 3-4 недели, инъекционными – №10-15.
- Эффект терапии можно усилить введением препаратов методом ступенчатой аутогемотерапии, гомеосиниатрии (в акупунктурные точки), биопунктуры.
- Эффективно проведение инъекций по методу «волдыря» паравертебрально и парастернально над обоими легкими, в области С3-С4 (передний край трапецевидной мышцы).
- Мазевую форму Траумель С применять в виде фонофореза №8-12.



### Применение препаратов Heel позволяет:

- оптимизировать течение и полноценно завершить воспаление
- сократить длительность и кратность антибиотикотерапии
- снизить риск развития дегенеративных изменений слизистых
- предупредить развитие тяжелых осложнений и хронизацию острого процесса