


Предменструальный синдром


Традиционная терапия предменструального синдрома носит симптоматический характер и воздействует на определенное звено этиопатогенеза. Протоколы лечения не предусматривают мер по регуляции лабильности гипоталамо-гипофизарно-оварияльной системы, коррекции функциональных расстройств ЦНС, уменьшению экзо- и эндогенной интоксикации и активации защитно-приспособительных механизмов организма.

Препараты Neel оказывают регуляторное воздействие на различные компоненты биологической системы организма, возвращая ему способность самостоятельно восстанавливать нарушенный баланс.

Препараты для ответственного самолечения пациента



Дополнительно рекомендуются провизором



Назначаются врачом, при необходимости



Особенности применения:

- Лечение необходимо начинать с иницирующего приема препаратов. При улучшении состояния – перейти на обычный режим приема.
- Курс лечения пероральными формами – 1-2 месяца, инъекционными – №10-15
- Эффект терапии можно усилить введением препаратов методом ступенчатой аутогемотерапии, гомеосиниатрии, биопунктуры: инъекции в рефлексогенные зоны, инъекции в триггерные точки, инъекции в точки акупунктуры.

Сегментарная терапия проводится по методу «папулы» или подкожных инъекций в нижней части живота.



Применение препаратов Neel позволяет:

- одновременно воздействовать на все патогенетические звенья развития ПМС
- эффективно и безопасно провести коррекцию гормонального гомеостаза
- уменьшить дозу, длительность приема и риск развития побочных эффектов заместительной гормонотерапии
- улучшить качество жизни и психо-эмоциональное состояние женщины