



# Травма операционная


Каждое операционное вмешательство сопровождается нарушением целостности покровов тела и появлением операционной раны. Основными задачами терапии в послеоперационный период являются снижение болевого синдрома, ускорение процессов заживления, восстановление функции поврежденного органа или ткани, профилактика раневых осложнений.

Препараты Neel позволяют оптимизировать течение послеоперационного процесса: купировать болевой синдром, уменьшить асептическое воспаление, отек и инфильтрацию послеоперационной раны, улучшить дренаж, трофические процессы и микроциркуляцию в поврежденных тканях.

## Препараты для ответственного самолечения пациента



## Дополнительно рекомендуются провизором



## Назначаются врачом, при необходимости



**Примечание:** с целью предоперационной подготовки препарат **Траумель С** вводят в месте с премедикацией.

### Особенности применения:

- Лечение необходимо начинать с иницилирующего приема препаратов. При улучшении состояния – перейти на обычный режим приема.
- Курс лечения пероральными формами – 2-3 недели, инъекционными – №5-10
- Эффект терапии можно усилить введением препаратов методом ступенчатой аутогемотерапии, гомеосиниатрии (в акупунктурные точки), биопунктуры (введение препарата п/к и в/к в болевые зоны). Эффективно проведение инъекций по методу «волдыря» вокруг послеоперационных швов.
- Мазевую форму препарата Траумель С возможно использовать в виде повязок или компрессов. Эффективно введение мази в виде фонофореза №8-12.



### Применение препаратов Heel позволяет:

- оптимизировать дренаж, трофические процессы и микроциркуляцию в поврежденных тканях
- регулировать течение и содействовать полному завершению воспаления сократить сроки послеоперационного периода
- снизить потребности в обезболивающих препаратах с нежелательными побочными действиями
- эффективно дополнить стандартную терапию и сократить сроки лечения