

Травма стоматологическая*


Понятие «стоматологическая травма» включает в себя не только травму ротовой полости, но и ряд других процессов, связанных с повреждением тканей: лечение кариеса, пульпита, периостита; удаление, протезирование, имплантация зубов и др. манипуляции. Традиционно, применяют антибиотики, противовоспалительные, антисептики и др. препараты, которые обладают побочными эффектами, имеют ряд противопоказаний и ограничений.

Препараты Heel влияют на все патогенетические звенья процесса, сопровождающего стоматологическую травму во всех ее проявлениях, а также предупреждают развитие осложнений и отдаленных последствий.

Препараты для ответственного самолечения пациента



Дополнительно рекомендуются провизором



*** врачевные манипуляции, хирургические вмешательства, травмы зубов и слизистой оболочки полости рта**

Назначаются врачом, при необходимости



Особенности применения:

- Лечение необходимо начинать с иницилирующего приема препаратов. При улучшении состояния – перейти на обычный режим приема.
- Курс лечения – до исчезновения симптомов. Кратность введения инъекционных препаратов зависит от выраженности болевого синдрома и отечности послеоперационной раны.
- Эффект терапии можно усилить введением препаратов методом ступенчатой аутогемотерапии, гомеосиниатрии (в акупунктурные точки), биопунктуры. Эффективно проведение инъекций в область переходной складки.
- Мазевую форму препарата Траумель С можно использовать в виде наложения под повязку или втирать вокруг места повреждения 2-3 раза в день. Эффективно введение мази в виде фонофореза №8-12.



Применение препаратов Heel позволяет:

- быстро купировать отек, экссудацию и болевой синдром
- оптимизировать дренаж, трофические процессы и микроциркуляцию в поврежденных тканях
- ускорить репаративные процессы и сроки реабилитации, сократить сроки послеоперационного периода
- снизить частоту развития осложнений (абсцесс, флегмона, сепсис, гнойный медиастенит и др.)