



# Травма черепно-мозговая


Система стандартов, разработанная по оказанию медицинской помощи при черепно-мозговой травме снижает летальность и частоту осложнений, но не решает всех вопросов, возникающие в ходе терапии. У пациентов могут длительно сохраняться неврологические или психические расстройства, возможно формирование отдаленных последствий.

Препараты Neel в самый ранний посттравматический период позволяют быстро купировать болевой синдром, затормозить развитие гематом и отека, значительно сократить время регенерации травмированных тканей, предотвратить образование спаек между оболочками мозга и др. посттравматических осложнений.

## Препараты для ответственного самолечения пациента



## Дополнительно рекомендуются провизором



## Назначаются врачом, при необходимости



### Особенности применения:

- Лечение необходимо начинать с иницирующего приема препаратов. При улучшении состояния – перейти на обычный режим приема.
- Курс лечения пероральными формами – 2-3 недели, инъекционными – №5-10.
- Эффект терапии можно усилить введением препаратов методом ступенчатой аутогемотерапии, гомеосиниатрии, биопунктуры: инъекции в рефлексогенные зоны, инъекции в триггерные точки, инъекции в точки акупунктуры. Эффективно проведение инъекций по методу «волдыря» вокруг места травмы или подкожно (субгалеатические инъекции по всей окружности головы).
- Мазевую форму препарата Траумель С можно использовать в виде повязок или компрессов.



### Применение препаратов Heel позволяет:

- начать лечение с первых минут после травмы
- быстро купировать отек, экссудацию и образование гематом
- ускорить репаративные процессы, восстановить структуру и функции травмированных тканей
- минимизировать развитие тяжелых последствий (неврологические и психические нарушения, органические поражения головного мозга)
- эффективно дополнить стандартную терапию и сократить сроки лечения