


Заболевания женской половой сферы



Хронический аднексит


Несмотря на большое количество используемых препаратов для лечения хронического аднексита, гинекологи продолжают сталкиваться с рядом проблем: снижение эффективности применяемых схем лечения, прогрессирование заболевания, частые рецидивы, вовлечение в воспалительный процесс соседних тканей и развитие спаечных процессов.

Препараты Neel позволяют более полно реализовать патогенетическую терапию, направленную на полное завершение воспалительного процесса, структурное и функциональное восстановление тканей. Препараты эффективно дополняют лечение, снижая побочные эффекты и минимизируя риск развития возможных осложнений.

Препараты для ответственного самолечения пациента



Дополнительно рекомендуются провизором



Назначаются врачом, при необходимости

Выраженные симптомы заболевания	Метро-Аднекс-Инъель (ампулы)	<ul style="list-style-type: none">• быстро уменьшает боль и отечность• регулирует нейроэндокринный баланс
Прогрессирование заболевания, ухудшение состояния	Траумель С (ампулы)	<ul style="list-style-type: none">• сдерживает активность воспаления• предотвращает развитие осложнений
Выраженный отек тканей, лимфаденит	Лимфомиозот Н (ампулы)	<ul style="list-style-type: none">• активирует процессы лимфодренажа и детоксикации• быстро устраняет отечность слизистой
Гнойные выделения, затяжное течение, выраженная интоксикация	Эхинацея композитум С (ампулы)	<ul style="list-style-type: none">• формирует адекватный иммунный ответ• уменьшает эндогенную интоксикацию
Частые рецидивы заболевания, угроза развития спаечного процесса	Мукоза композитум (ампулы)	<ul style="list-style-type: none">• нормализует секрецию и выведение слизи• восстанавливает структуру и функции слизистых мочеполовой системы

Особенности применения:

- Лечение необходимо начинать с иницилирующего приема препаратов. При улучшении состояния – перейти на обычный режим приема.
- Курс лечения пероральными формами – 1-2 месяца, инъекционными – №10-15.
- Эффект терапии можно усилить введением препаратов методом ступенчатой аутогемотерапии, гомеосиниатрии, биопунктуры: инъекции в рефлексогенные зоны, инъекции в триггерные точки, инъекции в точки акупунктуры.

Сегментарная терапия проводится по методу «папулы» или подкожных инъекций в нижней части живота.

- Эффективно проведение электрофореза, фонофореза с мазью Траумель С. Возможно, также введение тампонов с мазью во влагалище



Применение препаратов Heel позволяет:

- восстановить структуру и функции слизистой мочеполовой системы
- предупредить развитие спаечных процессов и дегенеративно-дистрофических изменений
- при рецидивирующем течении – затормозить прогрессирование воспаления, контролировать период ремиссии и обострения
- эффективно дополнить стандартную терапию и сократить сроки лечения