


Заболевания пищеварительной системы



Хронический гастрит (гастродуоденит)


Недостаточная эффективность традиционных схем лечения хронического гастрита (дуоденита) объясняется быстрым развитием резистентности *H. pylori* к антибиотикам, а также неполноценностью местного иммунитета слизистой оболочки гастродуоденальной зоны.

Препараты Neel комплексно воздействуют на все звенья патогенеза заболевания, обеспечивают противовоспалительное, обезболивающее, иммуномодулирующее действие, а также восстановление структуры и функции слизистой желудка и 12-перстной кишки.

Препараты для ответственного самолечения пациента



Дополнительно рекомендуются провизором*



Назначаются врачом, при необходимости



*С целью усиления эффекта терапии, врач может дополнительно включать в схемы препараты, которые рекомендовал провизор, но в инъекционной форме.

Особенности применения:

- Лечение необходимо начинать с инициирующего приема препаратов. При улучшении состояния – перейти на обычный режим приема.
- Курс лечения пероральными формами – 1-2 месяца, инъекционными – №10-15
- Эффект терапии можно усилить введением препаратов методом ступенчатой аутогемотерапии, гомеосиниатрии (в акупунктурные точки), биопунктуры (введение препарата п/к и в/к в болевые зоны и проекции органов).

Паравертебральные инъекции (по обе стороны) по методу «волдыря» в дерматомы Th5-Th9, вентрально над левой реберной дугой, а также между пупком и мечевидным отростком. Дополнительные инъекции по методу «волдыря» рекомендуется проводить в сегмент С3-С4 (передний край трапецевидной мышцы).



Применение препаратов Neel позволяет:

- существенно дополнить и усилить патогенетическую терапию хронического гастрита
- на начальных стадиях хронического гастрита – достичь полного выздоровления
- при длительном течении – затормозить прогрессирование, оптимизировать его течение, контролировать периоды ремиссии и обострения
- снизить риск развития атрофических и других процессов в слизистой желудка