

Хронический холецистит


Традиционная терапия хронического холецистита включает большое количество препаратов, каждый из которых влияет на одно звено патологического процесса. Кроме того, действие этих препаратов, как правило, сопровождается широким спектром противопоказаний, побочных эффектов, возрастных ограничений.

Препараты Heel оказывают противовоспалительный, холеретический и спазмолитический эффекты, а также восстанавливают моторно-эвакуаторную функцию желчного пузыря и желчевыводящих путей.

Препараты для ответственного самолечения пациента*



Дополнительно рекомендуются провизором*



Назначаются врачом, при необходимости



*С целью усиления эффекта терапии, врач может дополнительно включать в схемы препараты, которые выбрал пациент или рекомендовал провизор, но в инъекционной форме.

Особенности применения:

- Лечение необходимо начинать с иницирующего приема препаратов. При улучшении состояния – перейти на обычный режим приема.
- Курс лечения пероральными формами – 1-2 месяца, инъекционными – №10-15
- Эффект терапии можно усилить введением препаратов методом ступенчатой аутогемотерапии, гомеосиниатрии (в акупунктурные точки), биопунктуры (введение препарата п/к и в/к в рефлексогенные зоны печени).

Сегментарная терапия проводится по методу «папулы» или подкожных инъекций паравертебрально на уровне Th7-Th11, вентрально над правой реберной дугой и в сегменте С3-С4 в области переднего края трапециевидной мышцы справа.



Применение препаратов Heel позволяет:

- быстро устранить симптомы заболевания без их подавления
- улучшить моторно-эвакуаторную функцию желчного пузыря
- снизить риск развития ЖКБ и других тяжелых осложнений
- предупредить прогрессирование заболевания и увеличить период ремиссии
- эффективно дополнить стандартную терапию и сократить сроки лечения